

CIRCULAR 206 (06 agosto 2009)

PARA: ALCALDES MUNICIPALES, DIRECTORES LOCALES DE SALUD, GERENTES DE ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD Y DE INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD PUBLICAS Y PRIVADAS, PERSONAL DE SALUD

DE: DIRECTOR SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL DE ANTIOQUIA.

ASUNTO: INTENSIFICACION DE LA VIGILANCIA DE LA INFECCION RESPIRATORIA EN LAS MATERNAS

Ante la situación presentada con los casos de Influenza A H1N1 en las embarazadas, es necesario incrementar la vigilancia en los controles prenatales de los síntomas respiratorios, detectar oportunamente la Infección Respiratoria Aguda, IRA, en este grupo de población y definirla como caso sospechoso o enfermedad similar a la influenza e iniciar manejo clínico y terapéutico desde el primer nivel de atención para evitar complicaciones, explicar a la materna los signos de alarma para disminuir al máximo el riesgo de muerte por esta causa.

La Organización Mundial de la Salud nos alerta sobre el manejo oportuno de la infección respiratoria aguda en las embarazadas por ser una población de mayor riesgo para contraer el virus de Influenza.

Hasta el momento, la Organización Mundial de la Salud dice que se desconoce los efectos de este virus en los bebés mientras están en el útero materno.

Ginebra.-La Organización Mundial de la Salud afirmó hoy que las embarazadas deben incrementar sus cuidados, ya que son el grupo con mayor riesgo de contraer el virus H1N109 de la influenza humana y pudieran ser las más afectadas.

La portavoz de la OMS, Ashaluck Bhatiasavi, afirmó en rueda de prensa que especialmente las mujeres que esperan un bebé deben acudir al médico y examinarse de inmediato al presentar síntomas de gripe.

La OMS señaló que los antivirales como el Oseltamivir actúan con mayor eficacia si se consumen dentro de las primeras 48 horas en que se declara la enfermedad, por lo que

las embarazadas deben acudir cuanto antes al médico para que en caso necesario les sea recetado.

La OMS aprueba la prescripción de antivirales como el Tamiflú a las embarazadas, siempre y cuando se haga con estricto control médico. Explicó que en su caso el riesgo de contagio es mayor debido a que la pandemia afecta a personas sanas y jóvenes, en cuyo grupo la mayoría de las embarazadas se encuentra.

Hasta el momento, la OMS desconoce los efectos de la Influenza Humana en los bebés mientras están en el útero materno.

La Organización Mundial de la Salud señaló que varias investigaciones realizadas en Estados Unidos detectaron que las mujeres con embarazos avanzados que contraen el virus de la gripe A (H1N1) corren el riesgo de tener síntomas serios, o incluso de morir. En reporte publicado el lunes pasado, reportó 816 personas fallecidas a causa del H1N109 y más de 134 mil contagiados en prácticamente todos los rincones del mundo.

La información fue divulgada en la publicación científica The Lancet el pasado miércoles.

En un comunicado, el organismo de la ONU agregó que otros países donde ha cundido el contagio, se ha observado el mismo patrón, particularmente durante el segundo o tercer trimestre del embarazo.

Se ha reportado además que hay mayor peligro de muerte fetal o de abortos espontáneos de las mujeres infectadas.

La OMS destacó que la evidencia de que la salud de las mujeres embarazadas corre mayor riesgo durante las epidemias de gripe común, apoya la conclusión de los estudios relacionados con la pandemia de la gripe A (H1N1).

La Organización recomendó que los profesionales de salud y ese grupo vulnerable estén alertas a los síntomas que pudieran indicar la presencia de cualquier clase de gripe.

En cuanto la vacuna esté lista, las mujeres embarazadas deben ser las primeras en vacunarse.

Internacional / A (H1N1): Embarazo avanzado más riesgoso
31/07/2009 Fuente: ONU Radio | WEBMURCIA.COM

Firmado en original por:

CARLOS MARIO RIVERA ESCOBAR

Director Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia