

EDAD	VACUNA	DOSIS	ENFERMEDAD QUE PREVIENE
Recién nacido	Antituberculosa - BCG	Única	Meningitis tuberculosa
	Hepatitis B	De recién nacido	Hepatitis B
A partir de los 2 meses	PENTAVALENTE*	Difteria - tos ferina - tétanos (DPT)	Difteria - tos ferina - tétanos
		<i>Haemophilus influenzae</i> tipo b	Meningitis y otras enfermedades causadas por <i>Haemophilus influenzae</i> tipo b
		Hepatitis B	Hepatitis B
	Vacuna oral de rotavirus		Diarrea por rotavirus
	Vacuna oral de polio - VOP		Poliomielitis
	A partir de los 4 meses	PENTAVALENTE*	Difteria - tos ferina - tétanos (DPT)
<i>Haemophilus influenzae</i> tipo b			Meningitis y otras enfermedades causadas por <i>Haemophilus influenzae</i> tipo b
Hepatitis B			Hepatitis B
Vacuna oral de rotavirus			Diarrea por rotavirus
Vacuna oral de polio - VOP			Poliomielitis
A partir de los 6 meses	PENTAVALENTE*	Difteria - tos ferina - tétanos (DPT)	Difteria - tos ferina - tétanos
		<i>Haemophilus influenzae</i> tipo b	Meningitis y otras enfermedades causadas por <i>Haemophilus influenzae</i> tipo b
		Hepatitis B	Hepatitis B
	Vacuna oral de polio - VOP		Poliomielitis
De 6 meses a 23 meses	Vacuna de influenza	Primera	Enfermedad respiratoria causada por el virus de la Influenza
		Segunda a las cuatro semanas de la primera	
A los 12 meses	Sarampión Rubéola Paperas (SRP)	Unica	Sarampión, rubéola y paperas
	Fiebre amarilla (FA)	Unica	Fiebre amarilla
Al año de las terceras dosis	Difteria - tos ferina - tétanos (DPT)	Primer refuerzo	Difteria, tos ferina y tétanos
	Vacuna oral de polio - VOP	Primer refuerzo	Poliomielitis
A los 5 años de edad	Difteria - tos ferina - tétanos (DPT)	Segundo refuerzo	Difteria - tos ferina - tétanos
	Vacuna oral de polio - VOP	Segundo refuerzo	Poliomielitis
	Sarampión Rubéola Paperas (SRP)	Refuerzo	Sarampión, rubéola y paperas
Mujeres en edad fértil (MEF) Entre los 10 y 49 años**	Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td)	MEF** 5 dosis Td1: dosis inicial Td2: al mes de Td1 Td3: a los 6 meses de Td1 Td4: al año de la Td3 Td5: al año de la Td4 Si la MEF tiene antecedente de 5 dosis de DPT (tres de esquema y dos refuerzos) aplicar un refuerzo cada 10 años después de la 5 dosis (15, 25, 35 y 45)	Difteria, tétanos y tétanos neonatal
20 años después de la primera dosis***	Fiebre amarilla (FA)	Refuerzo cada 20 años	Fiebre amarilla en zonas endémicas
2 a 11 meses	Streptococo Neumonie****	2 meses: Primera dosis 4 meses: segunda dosis Al año de edad tercera dosis	Neumonías y Meningitis por Neumococo
12 a 23 meses		Dos dosis con intervalo de 8 semanas	
24 a 35 meses		Unica	

\* PENTAVALENTE: antígenos en presentación polivalente para menores de 1 año.

\*\* MEF Mujeres en edad fértil

\*\*\* En población de riesgo y según planes de contingencia vigentes.

\*\*\*\* Para niños con patologías especiales, bajo peso al nacer (menor o igual a 2500 g.) y 10 departamentos.