





Temperatura media de la cabecera municipal °C	Altitud de la cabecera municipal M.S.N.M	Extensión (km2)	Densidad poblacional habitantes por km2	Número de municipios	Número de subregiones
20	1600	255	64,3	41	3



Índice Demográfico	Año		
	2015	2022	2025
Poblacion total	15.427	16.392	16.893
Poblacion Masculina	7.861	8.385	8.653
Poblacion femenina	7.566	8.007	8.240
Relación hombres:mujer	103,9	104,7	105,0
Razón niños:mujer	36,3	34,6	30,9
Indice de infancia	28,8	26,5	25,3
Indice de juventud	25,5	24,0	23,6
Indice de vejez	10,6	13,5	14,5
Indice de envejecimiento	36,8	50,8	57,3
Indice demografico de dependencia	55,9	55,3	54,3
Indice de dependencia infantil	44,8	41,1	39,0
Indice de dependencia mayores	11,1	14,2	15,4
Indice de Friz	155,6	139,0	130,0






Autoreconocimiento étnico	Casos	%
Gitano(a) o Rrom	0	0,00
Indígena	27	0,18
Negro(a), Mulato(a), Afrodescendiente, Afrocolombiano(a)	71	0,47
Ningún grupo étnico	14.912	98,77
No informa	87	0,58
Palenquero(a) de San Basilio	0	0,00
Raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina	0	0,00
Total	15.097	100




Evento	Antioquia	Betulia	Año	Fuente
Intento de suicidio	63,3	55,8	2021	SIVIGILA
Suicidio	6,8	0,0	2020	SISPRO



Total afiliación (PEP + PPT)	47
Cobertura total (PEP + PPT)	97,9%
Cobertura solo PEP	97,9%



Mortalidad según grandes grupos de causas OPS lista 6/67
2005 – 2020



Semaforización de la mortalidad
materno – infantil y niñez. 2020

Causa de muerte	Antioquia	Betulia
Razón de mortalidad materna	47,36	0,00
Tasa de mortalidad neonatal	5,18	10,64
Tasa de mortalidad infantil	7,73	10,64
Tasa de mortalidad en la niñez	9,14	10,64
Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	4,97	0,00
Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	0,65	0,00
Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años	1,51	0,00

Distribución porcentual de causas de morbilidad atendida, por
ciclo de vida, 2009-2021

		Total														Δ pp 2020- 2021
Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	26,00	15,67	47,57	36,46	33,52	38,06	48,22	24,52	51,06	37,05	34,03	31,18	25,61	-5,57	
	Condiciones perinatales	1,60	41,04	1,94	8,62	2,29	1,22	0,98	10,63	0,82	0,90	1,52	3,01	21,05	18,10	
	Enfermedades no transmisibles	28,00	24,63	24,92	40,92	46,01	44,52	28,19	37,06	28,54	38,96	39,14	38,28	30,18	-8,10	
	Lesiones	12,00	8,21	5,18	6,92	5,03	5,40	6,08	11,44	5,85	8,06	10,42	14,84	9,82	-5,01	
	Condiciones mal clasificadas	28,00	10,45	20,39	7,08	13,15	10,80	16,52	16,35	13,72	15,04	14,90	12,69	13,33	0,65	
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	2,47	17,86	11,35	15,62	8,63	7,59	19,50	9,04	26,63	17,69	17,19	16,92	5,08	-11,83	
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,07	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	
	Enfermedades no transmisibles	91,36	60,71	72,16	52,28	75,98	77,44	45,81	59,89	40,96	48,35	50,51	48,50	57,63	9,13	
	Lesiones	1,23	12,50	7,93	16,05	8,44	6,14	15,31	19,21	14,91	14,51	14,10	14,29	27,12	12,93	
	Condiciones mal clasificadas	4,94	8,93	8,55	16,05	6,94	8,83	19,24	11,86	17,44	19,45	18,14	20,30	10,17	-10,13	
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	7,14	4,82	9,84	7,99	3,78	4,40	11,16	5,81	15,39	10,46	9,06	4,86	3,97	-0,89	
	Condiciones maternas	8,57	25,30	1,77	10,56	5,14	2,77	7,84	5,81	5,52	5,55	6,25	4,86	18,10	13,24	
	Enfermedades no transmisibles	55,71	40,96	60,53	49,02	71,99	74,23	47,74	41,16	43,28	49,55	48,04	51,62	59,16	7,54	
	Lesiones	20,00	16,87	10,84	12,37	10,14	6,76	12,86	32,45	17,61	16,16	17,04	20,95	14,13	-6,82	
	Condiciones mal clasificadas	8,57	12,05	17,02	20,06	8,96	11,84	20,40	14,77	18,20	18,28	19,62	17,71	4,64	-13,07	
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	6,10	6,71	7,62	6,72	5,99	6,28	8,14	5,49	9,98	7,74	8,32	6,29	1,71	-4,57	
	Condiciones maternas	17,07	8,72	8,73	15,89	9,28	9,95	11,67	20,09	9,67	11,80	11,50	8,35	23,52	5,17	
	Enfermedades no transmisibles	47,56	53,69	51,27	47,29	62,64	60,84	46,86	41,44	50,56	51,73	51,83	47,22	49,38	2,15	
	Lesiones	15,85	16,11	15,08	16,28	9,09	9,21	12,24	17,27	13,42	11,84	11,28	12,79	13,40	0,60	
	Condiciones mal clasificadas	13,41	14,77	17,30	13,82	12,99	13,72	21,08	15,70	16,36	16,89	17,07	15,35	11,99	-3,36	
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	3,75	5,54	4,48	5,82	6,14	5,14	6,24	4,97	8,93	6,22	5,20	3,74	5,29	1,55	
	Condiciones maternas	1,87	3,21	2,32	3,14	1,80	1,50	2,13	3,45	0,89	1,38	1,57	1,49	2,18	0,70	
	Enfermedades no transmisibles	67,42	67,68	72,61	70,33	73,29	74,27	71,05	65,24	72,44	72,60	70,68	70,53	72,82	2,29	
	Lesiones	12,73	11,07	6,09	6,53	7,29	6,59	6,07	10,48	6,81	7,36	8,90	10,35	12,76	2,42	
	Condiciones mal clasificadas	14,23	12,50	14,50	14,18	11,48	12,50	14,50	15,86	10,93	12,45	13,65	13,89	6,94	-6,95	
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	2,96	0,90	3,82	4,32	3,94	4,26	4,51	1,17	5,70	3,97	4,29	2,49	1,69	-0,80	
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	
	Enfermedades no transmisibles	85,93	81,79	75,98	83,12	82,14	83,21	82,52	82,37	83,06	82,59	80,04	83,81	87,45	3,44	
	Lesiones	4,44	2,69	5,78	3,29	4,20	3,97	3,70	6,38	2,76	4,57	5,37	4,08	5,06	0,98	
	Condiciones mal clasificadas	6,67	14,63	14,41	9,28	9,72	8,56	9,25	10,07	8,48	8,88	10,27	9,62	5,80	-3,82	

Fuente: SISPRO - RIPS

Determinantes intermedios de la salud
Condiciones de vida

Determinantes intermediarios de la salud	Año	Antioquia	Betulia
Cobertura de servicios de electricidad	2019	99,4	99,1
Cobertura de acueducto	2020	90,3	18,4
Cobertura de alcantarillado	2020	80,9	14,9
Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA)	2021	6,7	24,7
Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-DANE)	2018	13,1	28,6
Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (DNP-DANE)	2018	14,3	47,7

Fuente: SISPRO - RIPS

Determinantes intermedios de la salud
Seguridad alimentaria

Determinantes intermediarios de la salud	Año	Antioquia	Betulia
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (EEVV-DANE)	2020	9,2	8,5

Fuente: DANE

Determinantes intermedios de la salud
Sistema sanitario

Determinantes intermedios de la salud	Año	Antioquia	Betulia
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia (DNP-DANE)	2018	7,3	1,5
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud (DNP- DANE)	2018	4,5	7,4
Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS)	2021	99,6	95,9
Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos (MSPS)	2021	89,6	31,7
Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	2021	85,4	96,3
Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	2021	84,6	96,8
Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS)	2021	84,1	93,5
Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal (EEVV-DANE)	2020	87,2	90,4
Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE)	2020	99,1	97,3
Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-DANE)	2020	99,2	98,9

Fuente PAI – MSPS

Determinantes intermedios de la salud
Educación

Determinantes intermedios de la salud	Año	Antioquia	Betulia
Porcentaje de hogares con analfabetismo (DNP-DANE)	2018	8,5	28,0
Tasa de cobertura bruta de Educación categoría Primaria (MEN)	2021	105,4	97,0
Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Secundario (MEN)	2021	119,6	100,3
Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Media (MEN)	2021	90,7	70,5

Fuente: SISPRO

Secretaria Seccional de Salud y Protección Social
de Antioquia

Subsecretaria Planeación para la Atención en Salud
2023